





Comment éviter la confusion Lézard des murailles-Lézard vivipare

(Didier MONTFORT)

Deux petits Lézards «gris» sont présents en Loire-Atlantique, le Lézard des murailles, commun et largement répandu dans de nombreux habitats très variés, et le Lézard vivipare, plus rare et moins euryèce, souvent cantonné aux milieux humides et frais.

Pas toujours faciles à distinguer sur le terrain, les deux espèces présentent pourtant de nombreuses différences, assez nettes lorsque les conditions d'observation sont bonnes (... et avec l'animal en main pour certains des critères décrits ci-après).

LEZARD DES MURAILLES (<i>Podarcis muralis</i>)	LEZARD VIVIPARE (<i>Zootoca vivipara</i>)	Fiabilité du critère : +++ très bonne ++ bonne + moyenne
<p>Museau conique et pointu (tête assez plate et allongée) ; corps large et plat.</p>  <p>Nombreuses petites écailles (> 20) entre l'œil et l'écaille tympanique.</p>	<p>Tête non déprimée sur le dessus, et museau obtus et court ; corps épais et étroit.</p>  <p>Écailles assez grosses et peu nombreuses (< 20) entre l'œil et l'écaille tympanique.</p>	+++
<p>Cou bien distinct, avec collerette très nette d'écailles à bord postérieur non denticulé ; gorge blanc cassé, piquetée de noir (orange, rouge ou bleu chez le ♂ en période de reproduction).</p> 	<p>Cou assez peu marqué, avec collerette nettement denticulée ; gorge unie (bleuâtre chez le ♂ en période de reproduction).</p> 	+++
<p>Coloration ventrale (attention : polymorphisme important) : Jeune et ♀ = en général, plutôt blanchâtre et unie (queue généralement gris clair chez les juvéniles). ♂ = en général, plutôt jaune-orangée, rouge-crème, avec, parfois, des taches bleu-ciel sur les écailles ventrales externes.</p>	<p>Coloration ventrale : ♀ = jaune ou orange clair, rarement ponctuée de noir. ♂ = jaune-orangé assez vif, ou orange-rouge, souvent bien tachetée de nombreux points noirs. Jeune = gris foncé.</p>	+++
<p>Coloration dorsale (très variable) : Jeune et ♀ = unie, gris-brun, parfois olivâtre, avec, souvent, une ligne vertébrale sombre plus ou moins continue. ♂ = gris, brun, rougeâtre ou verdâtre, souvent réticulée ou tachetée de sombre et de blanc, contrastée ; ligne dorsale parfois absente.</p>	<p>Coloration dorsale : Adulte = brun-chocolat, jamais vert, avec une bande vertébrale sombre plus ou moins nette et plus ou moins régulière. Jeune = noirâtre (brun foncé, bronze noirâtre ou noir luisant).</p>	++
<p>Flancs : jeune et ♀ = sombres, délimités par deux lignes claires plus ou moins continues. ♂ = le plus souvent, mosaïque réticulée de taches noires, de taches bleu-ciel, de taches claires ... discontinues.</p>	<p>Flancs (polymorphisme important) : ♀ = sombres, délimités par deux lignes claires discontinues. ♂ = idem, mais moins sombres, moins marqués que chez la ♀. Jeune = foncés, presque noirs.</p>	++
<p>Écailles dorsales petites et fines.</p>	<p>Écailles dorsales assez grosses et d'aspect perlé.</p>	++
<p>Queue très longue et effilée.</p>	<p>Queue assez courte et assez épaisse.</p>	++
<p>Pattes fines avec de longs doigts.</p>	<p>Pattes et doigts assez courts.</p>	+

A noter aussi =

- ✓ plus de 4 petits granules entre les écailles supraoculaires et les écailles supraciliaires chez le Lézard des murailles, et seulement entre 0 et 4 chez le Vivipare ;
- ✓ un 4^{ème} orteil beaucoup plus long que la distance œil-tympan chez le Lézard des murailles, et à peine plus long chez le Vivipare ;
- ✓ l'écaille occipitale moins longue que la pré-occipitale chez le Lézard des murailles, subégale chez le Vivipare ;
- ✓ 13 à 27 pores fémoraux (pores situés à la face interne des cuisses, plus marqués chez les ♂ que chez les ♀) chez le Lézard des murailles, et seulement 5 à 15 chez le Vivipare, ...

De manière générale, en ce qui concerne les reptiles et les amphibiens d'Europe, se reporter à la dernière édition de l'excellent « Guide herpéto » (N. Arnold et D. Ovenden), chez Delachaux et Niestlé éd.